

В. А. ЛЮБЕЦКИЙ

**ИЗ СУЩЕСТВОВАНИЯ НЕИЗМЕРИМОГО МНОЖЕСТВА ТИПА  $A_2$   
ВЫТЕКАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ НЕСЧЕТНОГО МНОЖЕСТВА,  
НЕ СОДЕРЖАЩЕГО СОВЕРШЕННОГО ПОДМНОЖЕСТВА ТИПА  $CA$**

(Представлено академиком П. С. Новиковым 27 IV 1970)

Известны следующие проблемы дескриптивной теории множеств: верно ли утверждение (I): «существует несчетное множество типа  $CA$ , не содержащее совершенного подмножества»; верно ли утверждение (II): «существует множество типа  $B_2$ , не измеримое по Лебегу».

Постановка этих проблем была уточнена в терминах аксиоматической теории множеств. Именно, был поставлен вопрос о выводимости утверждений (I) и (II) или их отрицаний в той или иной аксиоматической теории — например, в теории Цермело — Френкеля (обозначают  $ZF$ ) или в теории Гёделя — Бернаиса (обозначают  $GB$  или  $\Sigma$ ). Заметим, что в силу общих метатеорем аксиоматической теории множеств (см. (1), стр. 149), выводимость в  $ZF$  утверждений (I), (II) или их отрицаний равносильна выводимости этих же предложений в  $GB$ .

П. С. Новиков (2) доказал, что отрицания предложений (I) и (II) не могут быть выведены в  $GB$ . В абстракте (3) Соловай объявил, не приводя доказательства, о существовании модели  $ZF$ , в которой, в частности, ложны утверждения (I) и (II). Автор настоящей заметки также построил модель  $ZF$ , в которой, в частности, ложно утверждение (I) и доложил этот результат на Всесоюзном симпозиуме по математической логике (Алма-Ата, 2—7 июня 1969 г., см. теорему 3а) в тезисах названного симпозиума (4). На симпозиуме была доложена также следующая теорема (не включенная, однако, в тезисы (4)):

**Теорема 1.** *Существует модель теории  $ZF$ , в которой (II) ложно, а (I) истинно.*

После ряда самых различных предложений, оказавшихся неразрешимыми средствами обычной теории множеств (например, предложения (I) и (II), предложение, что из (I) следует (II), и т. д.), кажется несколько удивительным, что один классический вопрос дескриптивной теории множеств может быть решен в рамках обычной наивной теории множеств без всяких дополнительных предположений.

**Теорема 2.** *Выводимо в  $ZF$ , что из существования неизмеримого множества типа  $A_2$  следует существование несчетного множества типа  $CA$ , не содержащего совершенного подмножества.*

Используя такой критерий (см. (4, 6)):  $ZF \vdash \exists u (L^+(u) \text{ — несчетно} \equiv (I))$ , теорему 2 легко вывести из следующего более общего утверждения.

**Теорема 2'.**

$ZF \vdash \exists u \exists \varphi (\varphi \in \Sigma_2^1(u) \wedge \{x \mid \text{Ист } \varphi(x)\} \text{ — неизмеримо}) \equiv R(u) \text{ — не меры } 0$ .

В формулировке теоремы 2' использованы следующие сокращения:  $\varphi \in \Sigma_2^1(u) \cup \Pi_2^1(u)$  означает, что формула  $\varphi$  содержит только два квантора по действительным числам (один квантор существования и один квантор

всеобщности) и любое число кванторов по натуральным числам, навешенным на предикат, разрешимый относительно действительного числа  $u$  (точное определение см. (5));  $L^+(u)$  это терм, выдающий по действительному числу  $u$  множество всех действительных чисел, конструктивных (по Гёделю) относительно числа  $u$ . Истф это формула  $ZF$ , имеющая следующий смысл: если формула  $\varphi$  содержит только кванторы по множествам действительных или натуральных чисел, то Ист  $\varphi$  означает, что формула  $\varphi$  истинна. Легко видеть, что для всякой  $\varphi$ ,  $\varphi \in \Sigma_2^1(u) \cup \Pi_2^1(u)$ , множество  $\{x \mid \text{Ист } \varphi(x)\}$  типа  $A_2$  или  $CA_2$ . И, наоборот, всякое множество действительных чисел типа  $A_2$  или  $CA_2$  может быть описано в этом смысле формулой  $\varphi$ ,  $\varphi \in \Sigma_2^1(u) \cup \Pi_2^1(u)$ .  $\bar{R}(u)$  это терм, выдающий по числу  $u$  множество неслучайных относительно  $u$  действительных чисел.

Когда ставились проблемы, сформулированные в начале настоящей заметки, то сами утверждения (I) и (II) некоторыми авторами (и, прежде всего, Н. Н. Лузиным: см. (7), стр. 553—556, 565) понимались иначе, чем утверждения о чистом существовании. Речь шла об «эффективном существовании», т. е. о том, можно ли эффективно задать тот или иной объект, даже если допустить, что такой объект существует.

**Теорема 3.** *Не существует терма  $T$  со свободными переменными  $x_1 \dots x_n$ , для которого в  $ZF + (I)$  доказуемо утверждение: « $\exists a_1 \dots \exists a_n$  ( $a_1 \dots a_n$  суть ординалы  $\&T(a_1 \dots a_n)$  есть  $A$ -множество, дополнение к которому несчетно и не содержит совершенного ядра)».*

Дадим набросок доказательства теоремы 3. Прежде всего по терму  $T_1$  типа  $\Pi_1^1$  можно построить такой терм  $T$ , который задает решето (см. (7), стр. 162), не просеивающее в точности множество  $\{x \mid T_1(x)\}$ . Допустим теперь противное: пусть терм  $T(a_1 \dots a_n)$ , где  $a_1 \dots a_n$  — произвольные ординалы, задает несчетное  $CA$ -множество, не содержащее совершенного ядра, точнее  $\dashv\vdash_{ZF} \exists a_1 \dots \exists a_n$  ( $a_1 \dots a_n$  суть ординалы  $\&T(a_1 \dots a_n)$  есть несчетное  $CA$ -множество без совершенного ядра). В частности, выводимо в  $ZF$ , что множество  $T(a_1 \dots a_n)$  есть объединение несчетного числа не пересекающихся констант, каждая из которых счетна. П. С. Новиков указал эффективный способ выбирать из  $CA$ -множества, заданного решетом, точку (см. (7), стр. 617). С помощью этого способа по терму  $T(a_1 \dots a_n)$  можно построить другой терм  $T'(a_1 \dots a_n)$ , обладающий следующим свойством: для всякого ординала  $\alpha$  такого, что  $\alpha$ -я константа решета  $T(a_1 \dots a_n)$  не пуста, терм  $T'(a_1 \dots a_n, \alpha)$  есть действительное число из этой константы. Терм  $T'(a_1 \dots a_n, \alpha)$  задает, следовательно, несчетную вполне упорядоченную последовательность различных действительных чисел, причем это обстоятельство выводимо в  $ZF$ , т. е. истинно во всякой модели  $ZF$ . Рассмотрим модель  $ZF$ , описанную в книге (1), стр. 267, взяв в качестве фигурирующего там  $\alpha$  первый несчетный ординал  $\omega_1^M$  минимальной модели  $M$ .

Будем обозначать эту модель  $N_h$ . Можно показать, что в  $N_h$  справедливо предложение (I). Терм  $T'$ , релятивизованный к  $N_h$ , дает несчетную последовательность действительных чисел в  $N_h$ , определимую этим термом  $(T')_N$ . С другой стороны, используя понятие пермутации, введенное А. Леви в (8) в связи с иной моделью, можно показать, что всякая определимая в  $N_h$  последовательность действительных чисел счетна (в  $N_h$ ). Это дает противоречие.

**Следствие.** *Не существует терма  $T$  без свободных переменных, для которого в  $ZF + (I)$  доказуемо утверждение: « $T$  есть  $A$ -множество, дополнение к которому несчетно и не содержит совершенного ядра».*

**Теорема 4.** *Не существует терма  $T$  со свободными переменными  $x_1 \dots x_n$ , для которого в  $ZF + (I) + (II)$  доказуемо утверждение: « $\exists a_1 \dots \exists a_n$  ( $a_1 \dots a_n$  суть ординалы  $\&T(a_1 \dots a_n)$  есть неизмеримое множество)».*

Следствие. *Не существует терма  $T$ , без свободных переменных, для которого доказуемо в  $ZF + (I) + (II)$  утверждение: « $T$  есть неизмеримое множество».*

Хочу поблагодарить моего руководителя В. А. Успенского, поставившего передо мной ряд интересных задач (на часть из них здесь даны ответы) и постоянно помогавшего мне в работе, и А. Г. Драгалина за многократные обсуждения этих теорем и советы по улучшению их доказательств.

Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова

Поступило  
18 III 1970

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

<sup>1</sup> П. Дж. Коэн, Теория множеств и континуум — гипотеза, 1969. <sup>2</sup> П. С. Новиков, Тр. Матем. инст. им. В. А. Стеклова, 38, 279 (1951). <sup>3</sup> R. Solovay, Abstract 65T—62, Notices Am. Math. Soc., 12, 217 (1965). <sup>4</sup> А. Г. Драгалин, В. А. Любецкий, Тез. докл. Всесоюз. симпозиума по математической логике, Алма-Ата, 1969. <sup>5</sup> J. W. Addison, Fund. Math., 46, 337 (1959). <sup>6</sup> В. А. Любецкий, ДАН, 182, № 4, 758 (1968). <sup>7</sup> Н. И. Лузин, Собр. соч., 2, 1958. <sup>8</sup> A. Levy, Proc. of the 1964 Intern. Congr., Amsterdam, 1966, p. 127.